

大豆主要農薬一覧表

平成27年8月13日現在

	農薬名	剤型	適用病害虫	使用量・希釈倍数 (10a当り)	散布量・希釈水量 (10a当り)	使用方法	使用時期	本剤 使用回数	備考
種子消毒 殺虫・殺菌	キヒゲンR-2フロアブル	フロアブル	鳥害忌避・苗立枯病・ 紫斑病・タネバエ	乾燥種子1kg当り 原液20ml	—	塗沫処理	播種前	1	チウラム含む1回
	クルーザーMAXX	水和剤	アブラムシ類・タネバ エ・ネキリムシ類・フタ スジヒメハムシ・リソク トニア根腐病・茎疫病・ 苗立枯病・紫斑病・黒 根腐病・鳥害忌避	乾燥種子1kg当り 原液8ml	—	塗沫処理	播種前	1	メタラキシル及びメタラキシルM含 む、4回以内(種子粉衣及び播種前 の塗沫処理は合計1回、播種後は3 回以内)
種子消毒 殺虫	クルーザーFS30	水和剤	アブラムシ類・タネバ エ・ネキリムシ類・フタ スジヒメハムシ	乾燥種子1kg当り 原液6ml	—	塗沫処理	播種前	1	チアトキサム3回以内(播種前塗 沫処理1回、播種後は2回以内)
除草	ラウンドアップマックスロード	液剤	一年生雑草	200～500ml	通常50～100ℓ 少量25～50ℓ	雑草茎葉散布	耕起前、又は出芽前まで(雑草生育期) 収穫前日まで(雑草生育期、畦間処理)	2	グリホサート含む4回以内
				500ml	50～100ℓ		落葉終期～収穫14日前まで(雑草生育期)		
	フィールドスター乳剤	乳剤	一年生雑草(アカザ 科、アブラナ科、タデ 科除く)	100ml～150ml	100ℓ	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	ジメテナミド含む1回
	フィールドスターP乳剤	乳剤	一年生雑草(アカザ 科、アブラナ科、タデ 科除く)	75ml～120ml	70～150ℓ	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	ジメテナミドP含む1回
	ブロールプラス乳剤	乳剤	一年生雑草	400～600ml	70～150ℓ	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	ジメテナミド及びジメテナミドPを含 む1回、ペンディメタリンを含む1回、 リニユロンを含む2回以内(全面土 壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土 壌散布は1回以内)
	バスタ液剤	液剤	一年生雑草	300～500ml	100～150ℓ	雑草茎葉散布	播種前・播種後発芽前(雑草生育期)収穫28日 前まで(畦間・株間本葉5葉期以降雑草生育期)	3	—
	ザクサ液剤	液剤	一年生雑草	300～500ml	100～150ℓ	雑草茎葉散布	耕起前(雑草生育期草丈30cm以下)	1	グルホシネート及びグルホシネート P含む1回以内
							収穫28日前(雑草生育期 播種・定植前又は畦間 処理)	3	グルホシネート及びグルホシネート P含む3回以内
	ダイロンゾル	水和剤	一年生雑草	150～200ml	100ℓ	土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	DCMU含む2回以内(出芽前は1回 以内、生育期は1回以内)
				100～200ml	100ℓ	雑草茎葉散布 兼土壌散布	生育期(畦間・株間処理:本葉5葉期以降雑草生 育期(草丈15cm以下))ただし、収穫30日前まで		
	デュアルゴールド	乳剤	一年生雑草	70～130ml	70～100ℓ	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	トラクロロール及びSトラクロロール 含む1回以内
	クリアタン乳剤	乳剤	一年生雑草	500～800ml	70～100ℓ	全面土壌散布	播種直後(雑草発生前)	1	ベンチオカーブ含む1回以内、ベン ディメタリン含む1回以内、リニユ ロン含む2回以内(全面土壌散布1回 以内、雑草茎葉兼土壌散布1回以 内)
				500～700ml			定植3日前まで(雑草発生前)		
	クリアタン細粒剤F	細粒剤	一年生雑草	4～5kg	—	全面土壌散布	播種直後(雑草発生前)	1	ベンチオカーブ含む1回以内、ベン ディメタリン含む1回以内、リニユ ロン含む(全面土壌散布1回以内、雑 草茎葉兼土壌散布1回以内)
	トレファノサイド粒剤2.5	粒剤	一年生雑草(ツユクサ 科、カヤツリグサ科、 アブラナ科を除く)	4～6kg	—	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	トリフルラリン含む2回以内(全面 土壌散布は1回以内)
畦間土壌散布						生育期、但し収穫45日前まで			
エコトップ乳剤	乳剤	一年生雑草	400～600ml	100ℓ	全面土壌散布	播種後発芽前(雑草発生前)	1	ジメテナミド含む1回以内、リニユ ロン含む2回以内(全面土壌散布1回 以内、雑草茎葉兼土壌散布1回以 内)	
大豆バサグラン液剤	液剤	一年生雑草(イネ科を 除く)	100～150ml	100ℓ	雑草茎葉散布	大豆2葉期から開花前(雑草の生育初期～6葉 期)、但し収穫45日前まで	1	ペンタゾンナトリウム含む2回以内 (畦間処理は1回以内)	
			300～500ml		畦間雑草茎葉 散布	大豆の生育期(雑草の生育初期～6葉期)、但し 収穫45日前まで			
ナブ乳剤	乳剤	一年生イネ科雑草(ス ズメノカタビラ除く)	150～200ml	100～150ℓ	雑草茎葉散布	雑草生育期イネ科雑草3～5葉期まで、但し収穫 30日前まで	1	セトキシジム含む1回以内	
			200ml	100ℓ		雑草生育期イネ科雑草6～8葉期まで、但し収穫 30日前まで			
殺虫・殺菌	アミスタートレボンSE	水和剤	紫斑病・カメムシ類	1000倍	100～400ℓ	散布	収穫14日前まで	2	エトフェンブロックス剤2回、アゾキ ンストロピン剤2回
				8倍	0.8ℓ	無人ヘリ散布	収穫21日前まで		
マナージトレボン粉剤DL	粉剤	紫斑病・カメムシ類・ア ブラムシ類	3～4kg	—	散布	収穫30日前まで	2	エトフェンブロックス剤2回、イミベン コナゾール剤2回	
			4kg						ハスモンヨトウ
殺虫	ジメエート粒剤	粒剤	アブラムシ類	3～6kg	—	作条施用	播種時	1	—
	スミチオン乳剤	乳剤	アブラムシ類	1,000～2,000倍	100～300ℓ	散布	収穫21日前まで	4	MEP含む4回以内
			マメシクイガ	1,000～1,500倍					
			カメムシ類・マメヒメサ ヤムシガ・シロイチモ ジマダラメイガ・ウコ ノメイガ・ダイズサヤタ マバエ	1,000倍					
	スミチオン粉剤3DL	粉剤	カメムシ類	4kg	—	散布	収穫21日前まで	4	MEP含む4回以内
				カメムシ類・フタスジ ヒメハムシ・ダイズサヤ タマバエ	3kg	—	散布	収穫7日前まで	2
	エルサン粉剤2	粉剤	シロイチモジマダラメイ ガ	3～4kg	—	散布	収穫7日前まで	2	PAP含む2回以内
			ハスモンヨトウ・マメ シクイガ	4kg					
	プレバソフロアブル5	フロアブル	ウコノメイガ・マメシ クイガ・ハスモンヨウ トウ	4,000倍	100～300ℓ	散布	収穫7日前まで	2	クロラントラニプロールを含む農 薬の総使用回数2回以内
			マメシクイガ・ハスモ ンヨトウ	16～32倍	0.8ℓ	無人ヘリ散布	—	—	
アディオン乳剤	乳剤	マメシクイガ・ジャガ イモヒゲナガアブラム シ	3,000倍	100～300倍	散布	収穫7日前まで	3	ベルメリンを含む農薬の総使用 回数3回以内	
		24倍	0.8ℓ	無人ヘリ散布					
撒粉ボルダー粉剤DL	粉剤	紫斑病	3～4kg	—	撒布	—	—	—	
		べと病・茎疫病・葉焼 病	4kg						